

HERBICRUZ® M50



Herbicida de contacto para el control de malas hierbas de hoja ancha en post-emergencia



HERBICRUZ® M 60 es un herbicida para el control post-emergente de las malas hierbas de hoja ancha, que se presenta en forma de concentrado soluble y dotado de una excelente selectividad en los cultivos

Composición:

MCPA (sal dimetilamina) 50% p/v (500 g/L)

Concentrado soluble (SL)

Presentación: 5 L

Inscrito en R.O.P.F. con el nº 22.720

Modo de empleo: Utilizar un volumen de caldo de pulverización de 400 a 600 litros/ha en una sola aplicación por campaña. Tratar preferentemente cuando las malas hierbas son jóvenes y están en crecimiento activo.

- **Cereales:** Tratar desde el final del ahijado al comienzo del encañado.
- **Arroz:** Tratar entre el comienzo del ahijado y el final del encañado.
- **Olivo:** No aplicar con aceituna caída.
- **Maíz:** Tratar cuando el cultivo tenga cuatro hojas.
- **Praderas y prados de gramíneas:** tratar solo en primavera.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

En el momento de la aplicación, la temperatura debe ser superior a 12 °C, y para obtener la máxima eficacia, esta temperatura debe mantenerse durante los días siguientes al tratamiento.

No se debe utilizar el producto cuando existen cultivos sensibles emergidos (crucíferas, leguminosas, frutales de hoja caduca, olivo, girasol,

remolacha, tomate, vid, pepino, estramonio, tabaco y cultivos de flores ornamentales y de arbustos frutales) a menos de 20 metros. La aplicación se efectuará mediante pulverización inferior a cuatro atmósferas, con un consumo de caldo mínimo a distribuir por hectárea de 200 litros. La proporción de gotas menores a 100 micras no será superior al 2%. Las temperaturas en el momento de la aplicación deben ser inferiores a 20 °C y los tratamientos se suspenderán cuando la velocidad del viento sea superior a 1,5 m/s.

Este herbicida debe almacenarse en lugar seco, fresco y ventilado, no debe compartir el local con semillas, abonos y otros productos fitosanitarios. Los aparatos que se utilicen para la distribución de herbicidas hormonales deben reservarse únicamente para ese uso.

Deben transcurrir 15 días entre la última aplicación y la entrada de ganado en cereales, maíz, praderas y pastos de gramíneas. En los demás cultivos no procede.

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS
Cereales	Malas hierbas de hoja ancha	1,6 - 2 l/ha
Arroz	Malas hierbas de hoja ancha	1 l/ha
Olivos, Cítricos, Frutales de hoja caduca	Malas hierbas de hoja ancha	2,4 l/ha
Maíz	Malas hierbas de hoja ancha	1,6 l/ha
Praderas y Prados de gramíneas	Malas hierbas de hoja ancha	2,4 - 3,2 l/ha

Adjunto

Tamaño

 [Ficha de Seguridad](#) [1]

7.67 MB

Adjunto

Tamaño

 [Ficha de transporte](#) [2]

79.28 KB

Source URL (modified on 29/05/2019 - 13:07): <https://www.kenogard.es/product/herbicruz50>

Links

[1] <https://www.kenogard.es/sites/default/files/102578.pdf>

[2] https://www.kenogard.es/sites/default/files/ficha_transporte_139.pdf